

## Gebrauchsinformation

# **Nux vomica-** *logoplex*<sup>®</sup>

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Homöopathisches Arzneimittel  
Für Tiere

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe,  
Ziegen, Hunde, Katzen

### **Zusammensetzung:**

Wirkstoffe pro 10 g (=10 ml):

Strychnos nux-vomica Dil. D6 0,4g, Chamomilla recutita Dil. D2 0,1g, Chelidonium majus Dil. D4 0,2g, Citrullus colocynthis Dil. D4 0,2g.

Sonstige Bestandteile:

Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

### **Darreichungsform und Inhalt:**

Flüssige Verdünnung zur Injektion, 20 ml.

### **Pharmazeutischer Unternehmer:**

FRANZ ZIEGLER GmbH,

Ötzer Str. 10, 86672 Thierhaupten,

Telefon: 08271-813111, Telefax: 08271-813112.

### **Anwendungsgebiete:**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.

### **Wechselwirkungen:**

Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathischen Arzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn **Nux vomica-logoplex**<sup>®</sup> gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

### **Gegenanzeigen:**

Keine bekannt.

### **Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation:**

Zur Verträglichkeit von **Nux vomica-logoplex**<sup>®</sup> bei trächtigen und laktierenden Tieren liegen keine Untersuchungsergebnisse vor. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

## **Nebenwirkungen:**

Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen. Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier / Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

## **Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer**

### **der Anwendung:**

Vor Entnahme gut durchschütteln. Zur subkutanen Injektion. Entsprechend Tierart und Körpergewicht beträgt die Einzeldosis:

Pferd, Rind . . . . . 10 ml

Kalb, Schwein . . . . . 5 ml

Ferkel, Schaf, Ziege . . . . . 3 ml

Hund, Katze jeweils pro kg KGW. . . . . 0,2 ml

Für einen Hund mit einem Körpergewicht von 10 kg beträgt das maximale Injektionsvolumen 3 ml, für eine Katze 1 ml.

Je nach Schwere der Erkrankung und Krankheitsverlauf ist die angegebene Dosierung nach 30 Minuten zu wiederholen. Nicht länger als bis zur vollständigen Heilung des Tieres.

## **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:**

Eine Injektion dieses Arzneimittels sollte nur von Tierärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die die jeweilige Injektionstechnik sicher beherrschen. Unsachgemäß durchgeführte Injektionen können zu bleibenden Schäden bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen führen. Nach der Applikation ist das Tier über einen angemessenen Zeitraum zu beobachten, um bei Anzeichen einer anaphylaktischen Reaktion sofort therapeutische Maßnahmen ergreifen zu können. Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

## **Wartezeit:**

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege

Essbare Gewebe . . . . . 0 Tage

Pferd, Rind, Schaf, Ziege

Milch . . . . . 0 Tage

## **Besondere Lagerungshinweise:**

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Nicht über 25°C lagern. Nicht konserviert. Nach Anbruch in der Flasche verbleibende Reste sind zu verworfen. Konsequente Kühlung und sterile Entnahme sind wichtige Bestandteile der sachgerechten Handhabung. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

## **Genehmigungsdatum der Packungsbeilage:**

März 2009 – Apothekenpflichtig!

Reg.-Nr.: 129344.00.00

## **Hinweise für Anwender:**

ZIEGLER Kombinationsarzneimittel bestehen aus natürlichen Vorkommen des pflanzlichen, tierischen und mineralischen Bereichs. In der vet.-hom. Literatur werden die Bestandteile dieses Arzneimittels u.a. beschrieben bei:

Verdauungsstörungen, regulierende oder unterstützende Therapie bei katarrhalischen und spastischen Koliken, spastischen Obstipationen, akuten Infekten der Atemwege, Druse, chronischen Erkrankungen der Atemwege, Pansenindigestionen, Durchfall nach Fütterungsfehlern, Meteorismus, Labmagendendilatation und -verlagerung.

## **Handelsform:**

Originalpackung mit 5 Flaschen á 20 ml flüssiger Verdünnung zur Injektion.