

Gebrauchsinformation

Flor de piedra- logoplex®

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Homöopathisches Arzneimittel
Für Tiere

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe,
Ziegen, Hunde, Katzen

Zusammensetzung:

Wirkstoffe pro 10 g (=10 ml):

Lophophytum leandri (Flor de piedra) Dil. D3 1,00g,
Chelidonium majus Dil. D4 0,50g, Lachesis Dil. D8 0,50g,
Strychnos nux-vomica Dil. D6 0,50g.

Sonstige Bestandteile:

Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

Darreichungsform und Inhalt:

Flüssige Verdünnung zur Injektion, 20 ml.

Pharmazeutischer Unternehmer:

FRANZ ZIEGLER GmbH,
Ötzer Str. 10, 86672 Thierhaupten,
Telefon: 08271-813111, Telefax: 08271-813112.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne
Angabe einer therapeutischen Indikation. Vor der
Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.

Wechselwirkungen:

Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathi-
schen Arzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen
Arzneimitteln auftreten. Wenn **Flor de piedra-logoplex®**
gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet
werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

Gegenanzeigen:

Keine bekannt.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation:

Zur Verträglichkeit von **Flor de piedra-logoplex®** bei trächti-
gen und laktierenden Tieren liegen keine Untersuchungser-
gebnisse vor. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopa-
thische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation
nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet wer-
den.

Nebenwirkungen:

Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen. Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier / Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung:

Vor Entnahme gut durchschütteln. Zur subkutanen Injektion. Entsprechend Tierart und Körpergewicht beträgt die Einzeldosis:

Pferd, Rind	10 ml
Kalb, Schwein	5 ml
Schaf, Ziege	3 ml
Hund, Katze jeweils pro kg KGW.	0,2 ml

Für einen Hund mit einem Körpergewicht von 10 kg beträgt das maximale Injektionsvolumen 3 ml, für eine Katze 1 ml.

Je nach Schwere der Erkrankung und Krankheitsverlauf ist die angegebene Dosierung nach 24 Stunden zu wiederholen. Die Verabreichung des Medikamentes sollte nicht länger erfolgen als bis zur vollständigen Heilung des Tieres.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Eine Injektion dieses Arzneimittels sollte nur von Tierärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die die jeweilige Injektionstechnik sicher beherrschen. Unsachgemäß durchgeführte Injektionen können zu bleibenden Schäden bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen führen. Nach der Applikation ist das Tier über einen angemessenen Zeitraum zu beobachten, um bei Anzeichen einer anaphylaktischen Reaktion sofort therapeutische Maßnahmen ergreifen zu können. Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Wartezeit:

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege	
Essbare Gewebe	0 Tage
Pferd, Rind, Schaf, Ziege	
Milch	0 Tage

Besondere Lagerungshinweise:

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Nicht über 25°C lagern. Nicht konserviert. Nach Anbruch in der Flasche verbleibende Reste sind zu verworfen. Konsequente Kühlung und sterile Entnahme sind wichtige Bestandteile der sachgerechten Handhabung. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Genehmigungsdatum der Packungsbeilage:

März 2009 – Apothekenpflichtig!
Reg.-Nr.: 133263.00.00

Hinweise für Anwender:

ZIEGLER Kombinationsarzneimittel bestehen aus natürlichen Vorkommen des pflanzlichen, tierischen und mineralischen Bereichs. In der vet.-hom. Literatur werden die Bestandteile dieses Arzneimittels u.a. beschrieben bei: Indigestionen ante und post partum, Pansenazidose; Labmagendilatation und Labmagenverlagerung, zur Vorbeuge und zur unterstützenden Therapie der Gebärpause; Hepatosen, Erhöhung der Leberwerte, Leberschutztherapie; Entgiftung und Ausscheidung von Stoffwechselschlacken, insbesondere in der Rekonvaleszenzphase nach intensiver pharmazeutischer Intervention.

Handelsform:

Originalpackung mit 5 Flaschen á 20 ml flüssiger Verdünnung zur Injektion.

Version: 11-0040-20-0309