



Gebrauchsinformation

## **Caelo Lebertran**

Öl zum Einnehmen

### **Zusammensetzung:**

100 g Caelo Lebertran enthalten arzneilich wirksame Bestandteile: Lebertran 100 g mit mindestens 850 I.E. Vitamin A/g und mindestens 85 I.E. Vitamin D/g

### **Darreichungsform und Inhalt:**

250 ml Öl

### **Stoff- oder Indikationsgruppe:**

Lebertranpräparat

### **Anwendungsgebiete:**

Prophylaxe der Rachitis. Vitaminmangel während der Schwangerschaft und in der Stillperiode.

### **Gegenanzeigen:**

Lebertran ist nicht anzuwenden bei erhöhtem Calciumplasmaspiegel, erhöhter Calciumausscheidung über die Niere und wenn andere Vitamin-D-haltige Arzneimittel verabreicht werden.

### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

Keine bekannt.

### **Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, nehmen bei Bedarf Säuglinge 1 Teelöffel (5 ml), Kleinkinder 1 bis 2 Teelöffel (5 bis 10 ml), Jugendliche und Erwachsene bis zu 1 Esslöffel (20 ml) voll Lebertran täglich ein.

### **Hinweise:**

Bei Einnahme größerer Mengen Lebertran (mehr als 5 Esslöffel täglich) können Anzeichen einer Vitamin-A-Überdosierung auftreten wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Gelenkschmerzen und Fissuren der Mundschleimhaut. Während der ersten drei Monate einer Schwangerschaft soll die tägliche Einnahme von mehr als einem Esslöffel voll Lebertran vermieden werden.

### **Nebenwirkungen:**

Bei Einhalten der angegebenen Dosierung ist nicht mit dem Auftreten von Nebenwirkungen zu rechnen.

**Hinweis:**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abteilung Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

**Hinweise:**

Gut verschlossen und nicht über 25°C aufbewahren. Angebrochene Flaschen sollen innerhalb von 4 Wochen verbraucht werden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Apothekenpflichtig.

**Stand der Information: Februar 2015****Pharmazeutisches Unternehmen:****Caesar & Loretz GmbH**

Herderstraße 31

D-40721 Hilden

Mail: [info@caelo.de](mailto:info@caelo.de) · [www.caelo.de](http://www.caelo.de)