

## Gebrauchsinformation

# Hämo- logoplex®

Flüssige Verdünnung zur Injektion

## Homöopathisches Arzneimittel

Für Tiere

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe,  
Ziegen, Hunde, Katzen

### Zusammensetzung:

Wirkstoffe pro 100 g (=100 ml): Achillea millefolium Dil. D6 1,0 g, Hamamelis virginiana Dil. D6 1,0 g. Phosphorus Dil. D12 1,0 g.

Sonstige Bestandteile:

Methyl-4-hydroxybenzoat, Natriumchlorid,  
Wasser für Injektionszwecke.

### Darreichungsform und Inhalt:

Flüssige Verdünnung zur Injektion, 100 ml.

### Pharmazeutischer Unternehmer:

FRANZ ZIEGLER GmbH, Ötzer Str. 10, 86672  
Thierhaupten, Tel. 08271-813111, Fax 08271-  
813112

### Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel,  
daher ohne Angabe einer therapeutischen  
Indikation. Vor der Anwendung sollte eine tier-  
ärztliche Untersuchung erfolgen.

### Wechselwirkungen:

Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei  
homöopathischen Arzneimitteln Wechselwir-  
kungen mit anderen Arzneimitteln auftreten.  
Wenn **Hämo-logoplex®** gleichzeitig mit einem  
anderen Arzneimittel angewendet werden soll,  
fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

### Gegenanzeigen:

Keine bekannt.

### Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation:

Zur Verträglichkeit von **Hämo-logoplex®** bei  
trächtigen und laktierenden Tieren liegen keine  
Untersuchungsergebnisse vor. Wie alle Arz-  
neimittel sollten auch homöopathische Arznei-  
mittel während der Trächtigkeit und Laktation  
nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt ange-  
wendet werden.

### Nebenwirkungen:

Hinweis: Bei der Behandlung mit einem ho-  
möopathischen Arzneimittel können sich die  
vorhandenen Beschwerden vorübergehend ver-  
schlimmern (Erstverschlimmerung).

In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel abset-  
zen und Ihren Tierarzt befragen. Falls Sie eine  
Nebenwirkung bei Ihrem Tier / Ihren Tieren fest-  
stellen, die nicht in der Packungsbeilage aufge-  
führt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder  
Apotheker mit.

## **Dosierung für jede Tierart, Art und Dauer der Anwendung:**

Zur subkutanen Injektion. Entsprechend Tierart und Körpergewicht beträgt die Einzeldosis:

Pferde, Rinder. . . . . 10 ml pro Tier  
Kälber, Schweine . . . . . 5 ml pro Tier  
Schafe, Ziegen . . . . . max. 3 ml pro Tier  
Ferkel max. 0,2 ml/kg KGW (max. 3 ml pro Tier)  
Hunde max. 0,2 ml/kg KGW (max. 3 ml pro Tier)  
Katzen max. 0,2 ml/kg KGW (max. 1 ml pro Tier)

Je nach Schwere der Erkrankung und Krankheitsverlauf kann die angegebene Dosis bei akuten oder perakuten Situationen für die Blutstillung von arteriellen/venösen Blutungen in Abständen von 5-10 Minuten verabreicht werden. Bei Besserung erfolgt die Arzneigabe in 30 bis 60-minütigem Abstand. Nicht länger als bis zur vollständigen Heilung des Tieres.

## **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:**

Eine Injektion dieses Arzneimittels sollte nur von Tierärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die die jeweilige Injektionstechnik sicher beherrschen. Unsachgemäß durchgeführte Injektionen können zu bleibenden Schäden bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen führen. Nach der Applikation ist das Tier über einen angemessenen Zeitraum zu beobachten, um bei Anzeichen einer anaphylaktischen Reaktion sofort therapeutische Maßnahmen ergreifen zu können. Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

## **Wartezeit:**

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege  
Essbare Gewebe . . . . . 0 Tage  
Pferd, Rind, Schaf, Ziege  
Milch . . . . . 0 Tage

## **Besondere Lagerungshinweise:**

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Nicht über 25°C lagern. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

## **Genehmigungsdatum der Packungsbeilage:**

Mai 2011 – Apothekenpflichtig!

## **Hinweise für Anwender:**

ZIEGLER Kombinationsarzneimittel bestehen aus natürlichen Vorkommen des pflanzlichen, tierischen und mineralischen Bereichs. Einsatzschwerpunkte in der tierärztlichen Praxis: Blutstillung (arteriell/venös), erhöhte Blutungsneigung, Blutmelken

## **Handelsform:**

Originalpackung mit 5 Flaschen á 100 ml flüssiger Verdünnung zur Injektion.