

Wobe-Mucos®

Zum Diätmanagement während und nach einer Chemo- und / oder Strahlentherapie



Wichtiger Hinweis: Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Nicht als einzige Nahrungsquelle geeignet.



Einsatzempfehlung

Zum Diätmanagement bei onkologischen Patienten während und nach einer Chemo- und / oder Strahlentherapie.

Dosierung und Einnahme

- Während der Chemo- und / oder Strahlentherapie
3 x 4 Tabletten täglich.
- Nach der Chemo- und / oder Strahlentherapie
3 x 2 Tabletten täglich.



Für eine optimale Wirkung sollte die Einnahme außerhalb der Mahlzeiten erfolgen, mindestens 30 Minuten vor oder mindestens 90 Minuten nach dem Essen.

Darreichungsform

Magensaftresistente Tabletten

Hinweise

Dieses Produkt enthält Stoffe aus der Papaya. Bei Einnahme von Blut verdünnenden Medikamenten oder bei bekannten Blutgerinnungsstörungen sollte der Verzehr mit dem Therapeuten oder Apotheker abgestimmt werden.



Nährstoffe

Nährstoffe von Wobe-Mucos®

	pro 100 g	pro 6 Tabletten	pro 12 Tabletten
Brennwert (kJ / kcal)	1028 / 251	31 / 8	62 / 16
Fett, davon ungesättigte Fettsäuren	1,9 g 1,4 g	0,06 g 0,04 g	0,12 g 0,08 g
Kohlenhydrate, davon Zucker	< 0,2 g < 0,2 g	< 0,1 g < 0,1 g	< 0,2 g < 0,2 g
Eiweiß	24 g	0,7 g	1,4 g
Salz (davon Natrium)	0,36 g (142 mg)	0,01 g (4 mg)	0,02 g (8 mg)
Papain (Papaya)	10 g	324 mg	648 mg
Trypsin (Rind, Schwein)	11 g	348 mg	696 mg
Chymotrypsin	5,7 g	180 mg	360 mg

Bestellinformationen

VE	Varianten	PZN
120 Stk.	Tabletten	11181068
360 Stk.	Tabletten	11181074

Wobe-Mucos® Ergänzende bilanzierte Diät

Zum Diätmanagement bei onkologischen Patienten während und nach einer Chemo- und/oder Strahlentherapie.

Zutaten: Füllstoff Cellulose; Papain (enthält Sulfite); Trypsin; Chymotrypsin; Füllstoff Hydroxypropylcellulose; Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren und Siliciumdioxid; Cocosöl; Überzugsmittel Natriumalginat, Ethylcellulose und Fettsäuren.